

Screening af kompleksitet i medicindispenseringer af doserbar medicin

Faktor

- Antal præparater (polyfarmaci) 1 - 4 Præparater = 0 Point
 5 Præparater = 1 Point
 6 - 7 Præparater = 2 Point
 8 Præparater eller derover = 3 Point
- Variabel dosering Ingen = 0 Point
 1 x ugentligt = 1 Point
 2 - 3 x ugentligt = 2 Point
 4 - 7 x ugentligt = 3 Point
- Antal givningstidspunkter pr. dag 1 - 2 gange dagligt = 0 Point
 3 - 4 gange dagligt = 1 Point
 5 - 6 gange dagligt = 2 Point
 Mere end 6 gange dagligt = 3 Point
- Antal tbl. der doseres i et rum i medicindosetten 0 - 5 tabletter = 0 Point
 6 - 8 tabletter = 1 Point
 9 - 10 tabletter = 2 Point
 11 tabletter eller derover = 3 Point
- APV ved dispenseringen, fx uro og pladsforhold APV i orden = 0 Point
 APV udfordret = 1 Point
 APV meget dårlig = 2 Point

Risikosituationslægemidler

- Risikosituationslægemidler med variable givningstidspunkter Ingen = 0 Point
 Fast til samme tid dagligt = 1 Point
 1 x ugentligt = 2 Point
 2 eller flere gange ugentligt = 3 Point
- Antal risikopræparater Ingen = 0 Point
 1 Præparat fra listen = 1 Point
 2 Præparater fra listen = 2 Point
 3 eller flere Præparater fra listen = 3 Point
- Methotrexat Hvis borgeren får Methotrexat, skal medicindispenseringen scores som kompleks, uanset om den ikke scorer point til dette.

I alt point

7 point eller færre = Ikke kompleks dispensering

8-13 point = Komplex medicindispensering

14-20 point = Meget kompleks medicindispensering

Risikosituationslægemidler: https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/risikosituationslaegemidler/~/_/media/46476517346E49F7A165D70B9520C489.aspx

1. Antidiabetika (insulin og perorale antidiabetika)
2. Antikoagulantia (ak) (ex warfarin, hepariner, nye orale ak-lægemidler)
3. Lavdosis methotrexat
4. Kalium (kaliumklorid, kaliumphosphat)
5. Opioider (ex morfin, codein, fentanyl, metadon, oxycodon, contalgin)
6. Gentamicin
7. Digoxin