



STYRELSEN FOR
PATIENTSIKKERHED

Patientsikker medicinbehandling

Lena Graversen, enhedschef, overlæge
Vidensformidling og læring

20. november 2019

Medicinhåndtering



**Vejledning om ordination og håndtering
af lægemidler nr. 9479 af 12. februar 2015**

Samarbejde med de øvrige styrelser



Du er her: IRF → Nyheder → Warfarin og nystatin

Warfarin og nystatin

Hændelserne peger på to problematikker, som øger risikoen for fejl dosering:

- Personalet doserer i den tro, at fosphenytoin og phenytoin er det samme stof.
- Både fosphenytoin og phenytoins styrker er påtrykt Pro-Epanutins label, og ved fortynding og dosering skaber de to forskellige styrker forvirring.

De fleste hændelser er endt uden skade for patienterne, men en hændelse resulterede i hjertestop, og en anden i forgiftning, som blandt andet resulterede i svær leverpåvirkning, nyrepåvirkning og skade på muskelvævet.

Styrelsen for Patientsikkerhed er på nuværende tidspunkt i dialog med lægemiddelfirmaet, Pfizer, og de øvrige europæiske lægemiddelfirmaer omkring muligheden for yderligere forebyggende initiativer.

OBS'en er et samarbejde mellem Pfizer, Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hent OBS-meddelelsen [her](#).

Hent artwork af Pro-Epanutins æske [her](#).

Hent artwork af Pro-Epanutins etiket [her](#).

Nystatin bør anvendes til behandling af mundhulesvamp ved samtidig brug af warfarin

Ny evidens bekræfter, at nystatin er et alternativ til miconazol til patienter som er i samtidig behandling med det blodfortyndende lægemiddel warfarin.

Interaktionen mellem warfarin og miconazol har været kendt i mange år. Miconazol inhiberer den hepatiske omsætning af warfarin medførende risiko for blødninger. I oktober 2015 gjorde Lægemiddelstyrelsen opmærksom på problematikken i Nyt om Bivirkninger og gennem IRF's månedsblad Rationel Farmakoterapi opfordrede Styrelsen for Patientsikkerhed i juni 2016 til forsigtighed ved samtidig brug af warfarin og miconazol. Begge styrelser oplevede et stigende antal indberetninger om blødninger hos patienter som typisk var i fast behandling med warfarin og som blev behandlet med miconazol for svampeinfektion i munden. I februar 2017 følger Læge svampemidler og fokuserer

Risiko for forveksling mellem Gardasil® og MFR-vaccinen

NYT OM

 BIVIRKNINGER

 NR. 10 • ÅRGANG

 NOVEMBER 2016

16. december 2016



Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer læger og sundhedspersonale til at være opmærksomme på, at der kan ske forvekslinger mellem Gardasil® og MFR-vaccinen

Gardasil® og MFR-vaccinen bliver markedsført af det samme firma, Sanofi Pasteur MSD, og pakningerne har mange lighedspunkter.

Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret 22 utilsigtede hændelser med forvekslinger mellem HPV-vaccinen Gardasil® og MFR-vaccinen i perioden fra 1/10/2015 til 8/9/2016.

Den sidste indberetning beskriver en gigtpatient, der var symptomfri i kortere tid ved behandling med Benepali end ved behandling med Enbrel. Der er ingen oplysninger om aktiviteten i gigtsygdommen, og det er derfor ikke muligt at afgøre, om det skyldes nedsat effekt af Benepali i forhold til Enbrel.

Utilsigtet hændelse rapporteret til Styrelsen for Patientsikkerheds database

Der er indberettet en utilsigtet hændelse, hvor oplysningen om, at Benepali ikke må anvendes til børn under 18 år, ikke var blevet videregivet til rette sundhedspersoner. Dette kan potentielt medføre fejlordinationer.

Mødefora:

- 4-direktør-møde (hvert kvartal)
- Koordinationsmøder (hver måned)
- Bilaterale møder om bl.a bivirkninger, receptbekendtgørelse og FMK
- DRUM – risikosituationslægemidler (halvårligt)
- Fagligt Forum for Patientsikkerhed



Doseringsforslag

Medicinpriser



FMK



Læger



Plejehjem


- Skal der etiketter på lægemidler der er købt i udlandet?
- Brentan/Warfarin
- Morfin 10 mg/ml
- Treshiba(Insulin)



Systemiske indsatser

FMK:

- Xarelto- AK behandling
- Komplekse doseringer i fx AK . 1/3 af ordinationer i FMK er fritekst ordinationer
- Dosisdispensering ved lægeskift



... fortsat

- Patientsikkerhed på uddannelserne
- Lægedage, folkemøde, KL, tandlægedage
- Fagblade
- Værd at vide



Utilsigtede hændelser
- en oplagt mulighed for at arbejde
målrettet med kvalitet og patientsikkerhed



Informationsfilm:

Af Maj Stougaard og Pia Knudsen

Hvad er Dansk Patientsikkerhedsdatabase?

○ Peter Carlsen er 78 år, kendt i praksis, da han i en årrække kom meget ofte i klinikken. Nu er der gået lidt tid, og han genkendes straks af sygeplejersken, der skal tage blodprøver på ham. Da han kommer til lægen, kan resultaterne ikke findes. Senere findes der blodprøvesvar på Peter Carlsen, men han har ikke været i klinikken, den dag blodprøven blev taget...

Je, hvorfor rapportering af utilsigtede hændelser er vigtig. Fra 1. januar 2016 skal almen praksis akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Et af formålene med DDKM er at fremme patientsikkerheden, hvilket bl.a. gøres ved rapportering af utilsigtede hændelser, så man lærer af de fejl, der sker.

2019

- Medicin uden skade- WHO
- Kæbenekrose
- Hyponatræmi/ IV Medicin
- Plastre skema
- Panodil




Læringsmateriale



DEMENS OG ANTIPSYKOTISK MEDICIN

Undervisningsmateriale til plejepersonale


STOP



TÆNK



TJEK



Korrekt håndtering af medicin, 2. udgave

- Afspejler hverdagen i 2019
- Svar på ofte stillede spørgsmål
- Erfaringer fra tilsyn
- Viden fra UTH'er
- Til personale og ledelse



Korrekt håndtering af medicin, 2. udgave

Uddybning og ekstra information,
bl.a.:

- Administrationstidspunkter
- Ansvarsfordeling
- Opbevaring udenfor originalpakning
- Håndkøbsmedicin
- Risikosituationslægemidler



Vil du vide mere?

Få Fokus på patientsikkerhed 2 gange årligt

- Fokus på patientsikkerhed giver indblik i vores igangværende nationale patientsikkerhedsindsatser. Fokus på patientsikkerhed henvender sig til alle, der interesserer sig for patientsikkerhed og udsendes to gange om året til alle, der abonnerer på vores nyheder i kategorien læring.
- [Abonner på nyheder](#)