



Huskeliste

Syv lægemiddelgrupper, der kræver din særlige opmærksomhed

Alle lægemidler kan indgå i en utilsigtet hændelse, men nogle lægemidler ses hyppigere i utilsigtede hændelser med alvorlige konsekvenser for patienten. Huskelisten kan hjælpe dig og din arbejdsplads med at være opmærksom på de lægemidler, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Du bør være ekstra opmærksom, når du håndterer disse syv lægemidler:

1. ANTIDIABETIKA (INSULIN OG PERORALE ANTIDIABETIKA)
2. ANTIKOAGULANTIA (WARFARIN, HEPARINER, NYE ORALE AK-LÆGEMIDLER)
3. LAVDOSIS METHOTREXAT
4. KALIUM (KALIUMKLORID, KALIUMPHOSPHAT)
5. OPIOIDER (FX MORFIN, CODEIN, FENTANYL, METADON, OXYCODON, PETHIDIN)
6. GENTAMICIN
7. DIGOXIN.

Hvad kan du og din afdeling gøre for at undgå utilsigtede hændelser?

- Forsøge at skabe ro omkring medicin håndteringen
- Forsøge at gøre din kommunikation om lægemidlerne entydig og klar
- Bede en kollega om at dobbelttjekke, når du har beregnet en dosis
- Tjekke indløbshastigheden på dråbetælleren og følge slangen fra patient til pumpe en ekstra gang
- Dobbeltkontrollere om ordinationen er i mg eller i antal tabletter, i antal ml eller i.e.
- Være særlig opmærksom på, om de blodprøver, som bruges til kontrol, er bestilt, taget og set
- Hjælpe med, at patienten kender den rette dosis og ved, hvornår og hvordan lægemidlet skal indtages (fx antal enheder eller at lægemidlet kun tages en gang om ugen)
- Være med til at skabe en kultur, hvor det er i orden at spørge, hvis man er i tvivl.

Få yderligere information om risikosituationslægemidler på stps.dk.